



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS
DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

TESIS

**PREVALENCIAS Y CAUSAS DE ABANDONO DE
LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA ANTES
DE LOS SEIS MESES EN LACTANTES DEL
HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA 2013**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
OBSTETRICIA**

PRESENTADO POR EL BACHILLER

CALDERON MEDINA, FLOR DEL PILAR

ASESOR

LEVEAU BARTRA, HARRY RAUL

ICA – PERÚ

2014

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivos conocer la prevalencia y los factores que determinan el abandono de la lactancia materna exclusiva en las lactantes del Hospital San José de Chincha en el periodo de mayo a octubre del 2013. Para ello se aplicó un cuestionario y se tomaron los datos epidemiológicos a 150 lactantes que tienen hijos de más de 6 meses. Los resultados del estudio indican que la prevalencia del abandono de la lactancia materna exclusiva es de 36.7 %. Asimismo en el primer mes se detectó un abandono del 31 %, 21.8 % en el segundo mes, 14.5 % en el tercer mes, 12.7 % en el cuarto mes, 11 % en el quinto mes y 9 % en el sexto mes. El abandono de la lactancia materna exclusiva es 40.2 % más frecuente en las lactantes que tienen trabajo dependiente, en comparación del 30.2 % de las que tienen trabajo independiente. La incidencia del abandono de la lactancia materna según el grado de instrucción de las madres, indica que las madres con primaria completa presentan 58.8 % de abandono, 34.7 % las madres que cuentan con secundaria y las que tienen instrucción superior 26.9 %. Por otro lado es más frecuente cuando la madre es de procedencia rural con 59.1 %, 27.4 % procedencia urbana y cuando el grado de conocimiento sobre LME de la madre es inadecuado presentando un 50.8 % en comparación a 26.4 % de las que sí tienen conocimiento adecuados.

PALABRAS CLAVES: Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud, Prevalencia, Estudios Transversales, Lactancia Materna, Conducta en la Lactancia.