



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**TESIS**

**“LA ENFERMERA Y SU LABOR EDUCATIVA CON LOS PADRES DE  
FAMILIA DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA  
PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE  
PIETRECINA DE CHACRASANA, CHOSICA - 2015”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN  
ENFERMERÍA**

**PRESENTADO POR:**

**GUTIERREZ RODRIGUEZ, SINRRY ALICIA**

**ASESOR:**

**MG. IDALIA MARIA CONDOR CRISOSTOMO**

**LIMA-PERÚ, 2018**

**“LA ENFERMERA Y SU LABOR EDUCATIVA CON LOS PADRES DE  
FAMILIA DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA  
PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE  
PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA - 2015”**



## RESUMEN

La presente investigación tuvo como Objetivo: Demostrar cómo se da la labor educativa de la enfermera en los padres de familia en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=40 padres de familia), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,835); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de ( $\alpha=0,957$ ).

## CONCLUSIONES:

La presente investigación tiene como título: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, encontrando que Antes de la aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento es Bajo, con un promedio de 11,3. Después de la aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento de pediculosis fue de nivel Bueno, con un promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo una diferencia significativa por la aplicación de la labor educativa, considerándola como eficaz. Comprobado estadísticamente mediante la t-student con un valor de 8,771, con 39 grados de libertad y con un nivel de significancia de valor  $p<0,05$ .

**PALABRAS CLAVES:** *Labor educativa de la enfermera, padres de familia en niños de 3 a 5 años, tratamiento de la pediculosis.*

## ABSTRACT

The present investigation had like Objective: To show how the educative work of the nurse in the parents of children in children of 3 to 5 years in the treatment of the pediculosis in the educative institution San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica in the year 2015 occurs It is a cross-sectional descriptive investigation, we worked with a sample of (n = 40 parents), for the collection of the information a Likert type questionnaire was used, the validity of the instrument was made by the trial of concordance of the expert judgment obtaining a value of (0.835); Reliability was carried out using Cronbach's alpha with a value of ( $\alpha = 0.957$ ).

## CONCLUSIONS:

The present investigation has as its title: The educative work of the nurse in the parents of children of 3 to 5 years, in the treatment of pediculosis in the Educational Institution San Pio of Pietrecina de Chacrasana, finding that Before the application of the educational work the treatment level is low, with an average of 11.3. After the application of the educational work, the pediculosis treatment level was Good, with an average of 16.6; making a difference of (-5.3). There is a significant difference for the application of educational work, considering it as effective. Statistically verified by the t-student with a value of 8.771, with 39 degrees of freedom and with a level of significance of value  $p < 0.05$ .

**KEY WORDS:** *Educational work of the nurse, parents in children from 3 to 5 years, treatment of pediculosis.*

## INDICE

	Pág.
<b>DEDICATORIA</b>	
<b>AGRADECIMIENTO</b>	
<b>RESUMEN</b>	i
<b>ABSTRAC</b>	ii
<b>ÍNDICE</b>	iii
<b>INTRODUCCIÓN</b>	v
<b>CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b>	
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Formulación del problema	3
1.2.1. Problema General	3
1.2.2. Problemas Específicos	4
1.3. Objetivos de la investigación	4
1.3.1. Objetivo general	4
1.3.2. Objetivos específicos	5
1.4. Justificación del estudio	5
1.5. Limitaciones de la investigación	6
<b>CAPITULO II: MARCO TEÓRICO</b>	
2.1. Antecedentes del estudio	7
2.2. Base teórica	15
2.3. Definición de términos	16
2.4. Hipótesis	17
2.5. Variables	18
2.5.1. Operacionalización de la variable	19

<b>CAPITULO III: METODOLOGIA</b>	
3.1. Tipo y nivel de investigación	22
3.2. Descripción del ámbito de la investigación	22
3.3. Población y muestra	22
3.4. Validez y confiabilidad del instrumento	23
3.5. Plan de recolección y procesamiento de datos	23
<b>CAPÍTULO IV: RESULTADOS</b>	24
<b>CAPÍTULO V: DISCUSION</b>	28
<b>CONCLUSIONES</b>	30
<b>RECOMENDACIONES</b>	31
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	32
<b>ANEXOS</b>	
Matriz	
Instrumento	

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar de qué manera la labor educativa de la enfermera influye en los padres de familia de niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa de San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.

La pediculosis es una infestación por piojos y liendres padecida desde la antigüedad, producida por el pediculos humanus capitis. constituye un problema mundial afecta principalmente a niños pre escolares y escolares, procedentes de todo tipo de estrato socioeconómico, en nuestro país afecta en mayor parte a la población infantil y no presenta incidencia estacional ya que aparece en cualquier época del año, luego de ser eliminadas siempre aparecen al inicio de clase y a mediados del año y desaparecen al finalizar el año es un ciclo común en los colegios e influye el hacinamiento de la familia y los hábitos de higiene personal en los niños.

Cuando se detecta estos parásitos el tratamiento es sencillo como, lavar la ropa en el día si es posible con agua caliente y exponer al sol la ropa de la cama es uno de los tratamientos y evitar usar sustancias peligrosas que puedan dañar al niño.

En los niños de la Institución Educativa San Pio de Pietrecina Chacrasana Chosica se encuentra tres aulas (1° 2° 3° ) se ha observado que la mayoría de los niños están somnolientos y han bajado en el rendimiento escolar así como en su desarrollo del niño, su apariencia física deficiente debido que los padres trabajan y dejan a sus hijos al cuidado de la hermano, abuelita o el vecino.

Frente a lo expuesto se considera pertinente la realización de la presente investigación por las razones expuestas y por tratarse del futuro de nuestra patria la cual no se formara adecuadamente con estas condiciones inadecuadas de formación y en donde los padres de familia deben aportar en bien de sus hijos.



Finalmente, el presente trabajo va a contribuir a ampliar, conseguir cambios y prevención de dichas enfermedades y un adecuado tratamiento para dicha enfermedades.

## **CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.**

La enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence Nightingale, quien es la pionera en sentar las bases de la enfermería moderna, es decir de la formación científica de las enfermeras. Nightingale junto a un grupo de enfermeras pudieron brindar cuidados con esmero y dedicación a los soldados de la guerra de Crimea, dando como resultado la mejoría de muchos de ellos, siendo pocos los que morían, lo que hizo notar frente a la sociedad la imagen e importancia del trabajo de la enfermera.

Con el pasar de los años surgen nuevos modelos de atención o cuidado para ejercer la profesión, pero todos ellos hablan de la relación enfermera – paciente y de la atención que se les debe brindar, buscando siempre una atención de calidad, técnica, científica y humanística.

Según la Organización Mundial de La Salud (OMS). Los piojos del cuero cabelludo son ectoparásitos hematófagos que pertenecen al suborden de los anopluros. Suelen transmitirse por contacto personal directo, aunque en ocasiones se transmiten también por vía indirecta, a través de las prendas de vestir, las toallas o la ropa de cama de las personas infestadas. La infestación por piojos es de distribución mundial, especialmente frecuente en condiciones de hacinamiento. Aunque la

higiene deficiente favorece la pediculosis corporal, los piojos de la cabeza afectan con igual frecuencia a los cabellos limpios y sucios.

El síntoma más característico de la pediculosis es el prurito intenso, lesiones urticaria y con relativa frecuencia, infecciones bacterianas, secundarias.

Cada una de las formas clínicas de pediculosis obedece a una especie distinta: la infestación del cuero cabelludo, a *Pediculus humanus capitis*; la del cuerpo, a *P. humanus corporis*, y la del pubis, a *Pthirus pubis*. En la actualidad la enfermedad se halla en África oriental y nororiental, donde la pobreza agrava el problema sanitario.

Según Revista argentina de dermatología Aspectos clínico-epidemiológicos sobre pediculosis capitis en arenales, Estado Falcón, Venezuela. La pediculosis capitis humana es una infestación del cuero cabelludo y del pelo, ocasionada por el *Pediculus humanus capitis*, la que puede producir infecciones bacterianas secundarias en el sitio del rascado, anemia, estrés social y psicológico con alteración en la calidad de vida.

El diagnóstico ectoparasitológico se realiza por observación directa con peine de huevos (liendres), sobre el cuero cabelludo, con porcentajes de infestación significativamente mayores en las niñas en edad escolar sin embargo, no fueron diferentes entre grupos étnicos y color de pelo.

Los síntomas significativamente asociados a pediculosis fueron el prurito. Otros posibles factores de riesgo significativamente involucrados en la dinámica de transmisión y mantenimiento de la infestación fueron: jugar en piso de tierra y lavarse el cabello <2 /semana. A la luz de los resultados obtenidos, es recomendable mejorar las condiciones socio-sanitarias del sector y mantener campañas de promoción y educación para la salud.

Según Eli Martínez, Marco Delgado y Manuel Liu de la facultad de medicina. Universidad nacional de san Agustín de Arequipa la pediculosis humana por pedículos humanos var. Capitis es favorecida por el nivel socioeconómico grado de hacinamiento y hábitos de higiene de la población se realizó una encuesta a 124 escolares, de ambos sexos, en un centro educativo del área urbano-marginal de Arequipa se examinó la cabeza(cabello y cuero cabelludo) y utilizando peines finos se procedió a recolectar a los paracitos colocando los espécimen en un tubo pequeño de vidrio, contenido alcohol al 70%, se anotaron los datos en la ficha clínico- epidemiológica utilizado para cada alumno. La prevalencia de pediculosis fue de 29,03%, siendo más frecuente en niños de 7 a 8 años de edad; con predisposición en el sexo femenino 42.62%,(26/61) que en el masculino 15.87%(10/63) y con mayor prevalencia en aquellos con cabello largo y sucio: así mismo, un mayor porcentaje en las personas que presentan un índice de hacinamiento por dormitorio.

En la institución educativa de San Pio de Pietrecina se encuentra ubicado en la segunda zona del asentamiento humano de Chacrasana Chosica y cuenta con 48 niños en el jardín aproximadamente se ha observado en la Institución Educativa San Pio Pietrecina de Chacrasana, que los niños de 3 a 5 años tienen piojo que en mayor proporción es por falta de higiene personal y el hacinamiento ya que se observó a la mayor parte de los niños con el cabello sucio, grasosa y somnolientos, también por que las mamás no se dedican a ellos a un 90% o 100% ya que ellas tienen que trabajar por las necesidades económicas.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.**

### **1.2.1. Problema general:**

la labor educativa de la enfermera en los padres de familia en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la institución educativa de San Pio de Pietrecina de chacrasana Chosica en el año 2015

### **1.2.2.- Problemas específicos:**

- Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la información a los padres las familias de la higiene personal en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres de familia en la información del tratamiento de la pediculosis en niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres de familia sobre las consecuencias de la pediculosis en los niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.

## **1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **1.3.1. Objetivo general**

Demostrar cómo se da la labor educativa de la enfermera en los padres de familia en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la institución Educativa San Pio de Pietrecina de chacrasana Chosica en el año 2015.

### **1.3.2. Objetivos específicos**

- Identificar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en la detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- Explicar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en la información a los padres de familias de la higiene personal en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- Evaluar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres de familia en la información del tratamiento de la pediculosis en niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- Evaluar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres de familia sobre las consecuencias de la pediculosis en los niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.

## **1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.**

### **1.4.1. Justificación**

El siguiente proyecto tiene la finalidad de concientizar a los padres de familia sobre factores que afectan directamente a salud de los niños de 3 a 5 años.

Ya que hoy en día se observa en mayor cantidad la enfermedad de pediculosis que afectan más a los pre escolares por falta conocimiento e interés de los padres en los asentamientos humanos

ya que se debe al hacinamiento de lugar, déficit de higiene personal todo ello influye significativamente en la proliferación de la pediculosis. Lo que va influir en el desarrollo y rendimiento escolar de los niños.

Frente a este problema el personal de enfermería tiene una labor muy amplia en la promoción y prevención de una enfermedad común en los lugares rurales y urbanos. La enfermera interviene en el tratamiento de la pediculosis; hace su labor preventiva y así acercarnos a las comunidades.

Así mismo educar a los padres y docente de niños de 3 a 5 años en el Centro Educativo San Pio de Pietrecine de Cracrasana en mejorar la higiene del cuero cabelludo y evitar la proliferación de la pediculosis.

Finalmente presentar a la institución correspondiente los resultados obtenidos para que le brinden la debida importancia al tema y así lograr que pongan en práctica las medidas preventivas.

### **1.5. LIMITACIONES**

- Falta de bibliografía.
- Falta de acceso a las bibliotecas de las universidades.

## **CAPITULO II: MARCO TEÓRICO**

### **2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO/MARCO REFERENCIAL.**

#### **2.1.1. Antecedentes Internacional:**

**Título:** “eficacia de la ivermectina vs benzoato de bencilo en el tratamiento de pediculosis capitis en niños de escuelas rurales del barrio naranjito y Cachipamba de la parroquia taquil del cantón Loja”

**Autor:** Mayra Alexandra Quezada Patiño

**Universidad:** universidad nacional de Loja área de la salud

**Año:** 2010-2011

**País:** Ecuador-Loja

**Resumen:** La pediculosis capitis es ahora más frecuente y difícil de tratar que en años atrás debido al incremento de resistencias a los insecticidas clásicos. Las escuelas y colegios se constituyen en centros de mayor contagio durante el inicio de clases por lo que es de suma importancia que los pediatras y médicos de atención primaria conozcan la epidemiología, transmisión, síntomas, distribución, diagnóstico con el fin de establecer un mejor tratamiento de esta infestación, utilizando una terapia



sencilla frente a otros tratamientos sistémicos o tópicos; de bajo costo, de fácil administración, con dosis única, y que presente una alta tasa de curación. Entre el mes de marzo a agosto del 2011 se llevó a cabo el presente estudio, que compara la efectividad de ivermectina vía tópica y benzoato de bencilo vía tópica en el tratamiento de pediculosis capitis en niños de 6 a 12 años de edad en 2 escuelas fiscales y rurales de la ciudad de Loja. Se encontraron 80 escolares infestados, de los cuales 45 (63.3%) correspondieron al sexo femenino y 35 (36.6%) al masculino. Los valores de prevalencia de pediculosis capitis de acuerdo a la edad, fueron más elevados en los niños de 6, 8 y 11 años que corresponden al 21.25%, 13.75% y 13.75 % respectivamente. En pacientes que recibieron tratamiento con ivermectina tópica se encontró una eficacia del 97,5 % (39 pacientes) y falla terapéutica en el 2,5% (1 paciente). En los pacientes que recibieron benzoato de bencilo tópico se encontró una eficacia del 82.5% (33pacientes) y falla terapéutica en el 17.5% (7 pacientes). Por lo tanto concluimos que estadísticamente la ivermectina posee mayor eficacia en relación al benzoato de bencilo en el tratamiento de pediculosis capitis

**Conclusiones:** En el tratamiento de la pediculosis capitis la Ivermectina presenta una eficacia del 97.5%; en comparación al benzoato de bencilo que presenta una eficacia del 82.5%.

- Benzoato de bencilo tuvo una eficacia del 82.5%, se observó como principal efecto colateral: prurito intenso del cuero cabelludo,
- Ivermectina tuvo una eficacia del 97.5%. No se observó efectos colaterales a las dosis empleadas.
- La Ivermectina es el fármaco que presenta mayor tasa de curación en relación al benzoato de bencilo en el tratamiento de pediculosis capitis.

**Título:** Pediculosis y tungiosis en una población indígena del estado bolívar.

**Autor:** Ontón Jorge Jefferson Melquiades

**Universidad:** UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO BOLÍVAR

**Año:** 29-oct-2009

**País:** Bolivia

**Resumen:** Las enfermedades por ectoparásitos son endémicas en comunidades económicamente deprimidas, representando así un problema de salud pública; que afecta a todas las clases sociales, principalmente a los estratos socioeconómicos más bajos. A pesar que en la actualidad estas infecciones representan un problema común, su estudio ha sido escaso en todo el país, y más aún, cuando parece haber un resurgimiento de las mismas debido a las condiciones socioeconómicas de ciertas zonas del país. El objetivo de este estudio, fue determinar la prevalencia de ectoparásitos: pediculosis y tungiosis en la comunidad de Chaparralito de Bongo, Municipio Sucre, estado Bolívar, Venezuela. La muestra estuvo representada por 29 individuos que voluntariamente dieron su consentimiento informado para participar en el estudio; a cada individuo de la comunidad que dio su consentimiento informado, se le llenó una ficha clínica epidemiológica y el método de Graffar modificado para su evaluación. En la control se tomaron los datos de identificación personal, datos socio-sanitarios, número de habitaciones, numero de dormitorios y número de habitantes; también se evaluaron las manifestaciones clínicas que presentó cada paciente (lesiones en piel, lesiones en uñas, fiebre, urticaria, entre otros. El diagnóstico de Pediculosis (*Pediculus humanus*) se realizó mediante la observación directa de piojos vivos (ninfas, adultos) o huevos embrionados (vivos) cementados a los pelos del cuero cabelludo; con respecto al diagnóstico de tungiosis se realizó mediante la

inspección clínica de las lesiones, que al principio parece un diminuto punto negro en la piel, pero luego va aumentando de tamaño desarrollándose una pápula eritematosa pruriginosa y dolorosa. La prevalencia de ectoparásitos encontrada fue del 40,3% (n=29); los resultados demostraron una elevada prevalencia de pediculosis capitis de 75,9% (27/29), la prevalencia

**Conclusiones:** Conclusiones  $\frac{3}{4}$  Existe una elevada prevalencia de ectoparásitos (40,3%) en la comunidad indígena Chaparralito de Bongo, sin predilección por el sexo o la edad, constituyendo un problema importante de salud pública.  $\frac{3}{4}$  La prevalencia de Pediculosis fue de (75,9%) y de Tungiosis (24,1%).  $\frac{3}{4}$  La elevada frecuencia de ectoparásitos (P. humanus y T. penetrans) demostrado en este estudio está relacionado con la falta de educación, la falta de aseo personal, ausencia de servicios públicos, ausencia de calzado, el bajo ingreso familiar y las deficientes condiciones socio-sanitarias en que vive la comunidad Chaparralito de Bongo.

**Título:** Pediculosis en escolares del colegio “Lucila palacios”. san Félix. Estado bolívar

**Autor:** Gineth Adriana González Hernández.

**Universidad:** Universidad de oriente Núcleo Bolívar

**Año:** 2010

**País:** Bolivia

**Conclusiones:** La pediculosis afecta al 42% de los escolares de la Unidad Educativa “Lucila Palacios”. • La pediculosis capitis, está presente en los escolares de todas las edades, pero con más frecuencia en los grupos de 6 a 8 años, que mayormente corresponde el tercer grado de la etapa escolar, siendo al sexo femenino el más comprometido, sin embargo se puede presentar

en ambos sexos en la misma proporción. • Los escolares que presentan el cabello largo, fueron los más afectados por la pediculosis, así como también aquellos con deficiente higiene del cabello. • La pediculosis fue más frecuente en los escolares de cabello liso, pero se puede presentar en cualquier tipo de cabello.

**Título:** Representaciones sociales sobre la pediculosis en las profesoras, señoras de servicio generales, padres de familia y niños de jardín infantil de la universidad nacional de Colombia. Sede Bogotá

**Autor:** Esperanza muños torres

**Universidad:** Universidad Nacional de Colombia

**Año:** 2007

**País:** Colombia

### **Resumen**

La pediculosis o infestación por piojos, es un fenómeno social presente en la humanidad desde los tiempos antiguos, que se ha constituido en un problema de salud pública a nivel mundial dada su alta prevalencia y los efectos que provoca especialmente entre los niños en edad escolar. Se realizó un estudio de tipo cualitativo en el Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia con el objetivo de conocer, describir e interpretar las representaciones sociales que sobre pediculosis tienen las profesoras, el personal de servicios generales, los padres familia y los niños. La información se obtuvo por medio de una entrevista semiestructurada utilizando la modalidad de grupo focal. Se encontró que las representaciones están en proceso de transformación, lo que se expresa en una tensión entre la cultura tradicional y el surgimiento de significados socioculturales alternativos que nacen de las experiencias cotidianas que tienen

los padres y los niños que presentan piojos. La pediculosis es percibida por los participantes del estudio como un riesgo y un problema social que provoca efectos a nivel físico, psicológico y a nivel intelectual. La Salud Pública debe prestar mayor atención a este problema, lo cual implica una transformación en su manejo, de una perspectiva individual a una perspectiva intersectorial, dado que los seres humanos están inmersos dentro de un contexto global y son modelados por fuerzas socioculturales que operan a nivel de la sociedad, del grupo y del espacio familiar.

**Conclusiones:** Esto se explica por la propagación rápida de los piojos y los efectos que trae para los niños

- A nivel intelectual afectando los procesos de enseñanza aprendizaje
- A nivel emocional, por la estimación que se hace a las personas que tienen piojo, afectando la salud mental.
- A nivel físico por las molestias provocadas con la picadura del paracito.

La liendre es percibida como un indicador de piojos y un riesgo para su proliferación, por ello es vista como un señal para alejarse de las personas que las tienen.

Al conocer el conocimiento científico con el conocimiento del sentido común se identifica una correspondencia entre lo mencionado por la teoría y lo descrito por las personas, con relación al concepto y descripción de piojo y la liendre. Ya que es un conocimiento recogido de la experiencia de las mujeres al sentir y ver los piojos y las liendres cuando despiojan a sus hijos

Sin embargo, se observa también que en algunas personas hay información que no concuerda entre si y que desde la óptica científica, es vista como errónea, imprecisa y/o confusa como:

- Los piojos saltan.
- Para algunos niños los piojos vuelan y las liendres caminan.

- El piojo y la liendre se alimentan del cuero cabelludo
- Algunos padres hombres consideran que los piojos se encuentran en los perros.
- Los niños asimilan los piojos a las cucarachas que se encuentran en las cocinas, o a las hormigas que viven en los arboles
- Hay confusiones en algunas señoras de servicio generales entre los piojos de la piel y la escabiosis.
- Los hombres hablan de tierra caliente.
- Algunas madres consideran que no hay de prevenir la pediculosis.
- Para algunas señoras de servicio general y profesoras una forma de prevenir los piojos es tener triturado el cabello.

La percepción de los entrevistados sobre el concepto de salud y enfermedad presenta algunas variantes que dependen de género de las personas.

La representación social que tienen las profesoras, señoras de servicios generales, padres de familia, cuidadores y niños del jardín infantil tiene sobre el piojo y la pediculosis hace referencia a un riesgo y un problema social que con el tiempo pueden ser perjudiciales debido a su propagación rápida y los efectos para el niño, entorno familiar y comunitario

Al conocer las representaciones sociales de las personas en este estudio sobre la pediculosis se señala la mejor forma para el desarrollo de programas de salud que ofrezcan cuidados competentes, seguros y culturalmente congruentes para los miembros del jardín infantil.

Los programas de salud deben integrar la investigación, asistencia y educación por parte de todos los actores involucrados con el fin

de facilitar el encuentro de saberes para tomar la mejor decisión y así enfrentar el fenómeno de la pediculosis en el jardín infantil.

### **2.1.2. Antecedentes Nacionales**

**Título:** efectividad del programa educativo conocimiento y practica en madres, para controlar la pediculosis en una institución educativa primaria, la victoria 2013

**Autor:** Bach. Ana Cecilia Cabrejo Horna Bach. Patricia del Carmen Villena Carhuallanqui

**Universidad:** UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

**Año:** 2014

**País:** Chiclayo- Perú

**Resumen:** La presente investigación tuvo por objetivo determinar la efectividad de un programa educativo en el conocimiento y práctica de las madres para el control de pediculosis en escolares, la metodología fue cuantitativa, con diseño cuasi experimental de corte longitudinal. La muestra de estudio estuvo conformada por 60 madres de niños con pediculosis; las 25 madres que asistieron al programa educativo formaron el grupo experimental y las 35 que no asistieron, al grupo control. Para medir el conocimiento de las madres se utilizó un cuestionario, y para medir la práctica se usó una lista de cotejo para los niños en dos momentos y sirvió para detectar la presencia o ausencia de piojos. En esta investigación se respetó los principios éticos de Sgreccia; y de rigor científico de Lincoln y Guba. Como resultado existe diferencia entre las puntuaciones medias del pretest y postest del grupo experimental, se aprecia que la significancia para la hipótesis planteada es menor a la especificada (0.05) concluyendo que el programa educativo tuvo un efecto significativo en el nivel de conocimiento; para el control de

pediculosis. En cuanto a la práctica, el resultado de la lista de cotejo la presencia de piojos en los niños cuyas madres participaron; disminuyó significativamente. Antes del programa el 100% presentaban piojos y después del programa disminuyó a 44%. Esto no ocurrió con los niños cuyas madres no ingresaron al programa. Encontrando que sólo el 17.14% no presentaron piojos. Concluyendo que el programa educativo tuvo un efecto medio en el control de pediculosis.

**Conclusiones:** El programa educativo fue efectivo en el conocimiento, esto se evidenció mediante la prueba t de Student en la cual se obtuvo un valor t de (4,7), donde las madres participantes ampliaron sus conocimientos sobre la importancia que tienen los hábitos de higiene en la prevención de pediculosis; y por medio de la lista de cotejo se pudo evidenciar que dicho programa fue efectivo en la práctica

## 2.2. BASE TEÓRICA

**Enfermera:** es aquella mujer que se dedica al cuidado personal e intensivo de un paciente, ya sea en el centro hospitalario o de salud como en su domicilio particular. La enfermera o enfermero son personas que han seguido la carrera de enfermería, dictada dentro de las facultades de medicina y considerada una carrera universitaria a pesar de ser más corta e implicar menores conocimientos que la de medicina.

**Tratamiento:** De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el término tratamiento referirá diversas cuestiones. En términos generales, por tratamiento se designará a la acción y el resultado de tratar alguna cuestión o cosa, es decir, la forma o aquellos medios que se utilizarán para llegar a conocer la esencia que compone algo y que no se nos presenta de manera clara, ya sea porque no se conoce o bien porque su composición fue alterada por otros componentes.



**Labor:** Conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con un fin determinado por una persona, una profesión o una entidad, Cualquier trabajo que realiza alguien, Resultado, material o inmaterial, de una labor o trabajo realizados por alguien; especialmente el artesanal o manual confeccionado con hilo u otra materia semejante.

**Educativa:** El término 'educativa' se utiliza como adjetivo para hacer referencia a todos aquellos procesos, eventos y situaciones relacionados con uno de los fenómenos más importantes de la Humanidad: la educación. La condición de 'educativa' es aquella que implica la existencia de elementos educacionales aplicables sobre los individuos con un objetivo formativo en numerosos sentidos.

**Niños de 3 a 5 años:** Es un periodo de gran enriquecimiento en la interrelación. El niño está escolarizado en la escuela infantil, lo que implica una ampliación y aprendizaje de respeto a normas sociales y de convivencia; en los aspectos motores, la carrera se hace estable y la madurez de las habilidades motoras implica la capacidad de juegos que necesiten estabilidad y equilibrio (bicicleta, balón), así como de juegos de intercambio social con otros niños de su entorno.

**Pediculosis:** infestación con piojos adultos y liendres (huevos) en el cuero cabelludo, las partes vellosas del cuerpo, o la ropa, especialmente en las costuras inferiores de la misma.

### 2.3. DEFINICION DE TERMINOS

**Labor educativa:** Son actividades basadas en la educación para la salud que realiza la enfermera en el primer nivel de atención. Esta actividad está orientada a promover cambios de comportamiento y actitudes a favor de la salud de la población, aplicando el proceso de enseñanza – aprendizaje y técnicas de comunicación, Está dirigida al individuo y grupos de personas en diferentes etapas de vida.

**Tratamiento de pediculosis:** Es muy importante no utilizar sustancias peligrosas (como kerosén, insecticidas órgano fosforados, etc.). Estos elementos pueden ser extremadamente tóxicos para la salud. Lo ideal es la consulta con el pediatra o dermatólogo para que sea él quien indique el tratamiento más adecuado para eliminar tanto a la población adulta de piojos como a su cría (huevos y larvas).

- Lavar la ropa usada en el día con agua caliente
- Pasar aspiradora en sillones, asientos de auto.
- Cambiar la ropa de cama y lavarla con agua caliente.
- Lavar los juguetes de uso diario.
- Lavar con agua caliente los peines y cepillo de uso diario.

## **2.4. HIPÓTESIS**

### **2.4.1. Hipótesis general.**

- La labor educativa de la enfermera en los padres de familia influye significativamente en el tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución educativa de san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015.

### **2.4.2. Hipótesis específico.**

- La labor educativa de la enfermera influye en la detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- La labor educativa de la enfermera influye en la información a los padres de familias de la higiene personal en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.

- La labor educativa de la enfermera influye en la falta de conocimiento de los padres de familia en la información del tratamiento de la pediculosis en niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.
- La labor educativa de la enfermera influye en la falta de conocimiento de los padres de familia sobre las consecuencias de la pediculosis en los niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.

## **2.5. VARIABLES**

La variable utilizada en el presente estudio es:

**Variable independiente:** Labor educativa de la enfermera en los padres de familia.

**Variable dependiente:** Tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años.

**Variable interviniente:** Edades de 3 a 5 años.

### 2.5.1. Operacionalización de variable.

VARIABLE	Definición de la variable	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA - TIPO
<b>Variable independiente</b>				
Labor educativa de la enfermera.	Son actividades basadas en la educación para la salud que realiza la enfermera en el primer nivel de atención. Esta actividad está orientada a promover cambios de comportamiento y actitudes a favor de la salud de la población, aplicando el proceso de enseñanza – aprendizaje y técnicas de comunicación, Está dirigida al individuo y grupos de personas en diferentes etapas de vida.	<p><b>Diagnostico</b></p> <p><b>Planificación</b></p> <p><b>Ejecución</b></p> <p><b>evaluación</b></p>	<p>-Identificación del problema. -determinar el juicio clínico</p> <p>-Coordinación con los profesores para realizar las sesiones educativas.</p> <p>-Identificación de las necesidades de los alumnos.</p> <p>-Elaboración de cronograma de las actividades educativas.</p> <p>-Actividades educativas en los diferentes escenarios.</p> <p>-Desarrollo del tema educativo referente a la salud del niño.</p> <p>-Técnicas de enseñanza que se aplica</p> <p>-Materiales educativos que se usa</p> <p>-Tiempo o</p>	<p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p>

			<p>duración de las actividades educativas.</p> <p>-Personas responsables a la ejecución de las actividades</p> <p>-Realizar preguntas del tema “pediculosis” que permitan evaluar el tema desarrollado.</p> <p>-Refuerzo de las preguntas inadecuadas.</p> <p>-Análisis constructivo de las sesiones educativas.</p>	<p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p>
<b>Variable dependiente</b>				
Tratamiento de Pediculosis	<p>Lo ideal es la consulta con el pediatra o dermatólogo para que sea él quien indique el tratamiento más adecuado para eliminar tanto a la población adulta de piojos como a su cría (huevos y larvas).</p> <p>Lavar la ropa</p>	<p>Hacinamiento</p> <p>Falta de higiene</p> <p>Falta de conocimiento</p>	<p>-Revisas el avance del mejoramiento de hacinamiento del hogar</p> <p>-Realiza seguimiento a los cuidados de higiene.</p> <p>-Verificar que las etapas del lavado sean correctas.</p>	<p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p>

	<p>usada con agua caliente;  Pasar aspiradora en sillones, asientos, etc;  Cambiar la ropa de cama y lavarla con agua caliente;  Lavar los juguetes de uso diario;  Lavar con agua caliente los peines y cepillo de uso diario y es muy importante no utilizar sustancias peligrosas (kerosén, insecticidas, etc.)</p>	<p>Y Consecuencias de la pediculosis.</p>	<p>-Evaluar lo aprendido del tema.   -Verificar que las consecuencias hayan disminuido</p>	<p>Cualitativa   Cualitativa</p>
--	--	---	--	--

## **CAPITULO III: METODOLOGÍA**

### **3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO.**

Nivel de estudio es descriptivo correlacional y de corte transversal.

Investigación descriptiva ya que describe situaciones, eventos y hechos, cuyo objeto fundamental es la descripción de fenómenos detallando las características de un objeto de estudio en este caso, la labor educativa de la enfermera en la población.

### **MÉTODO**

El presente trabajo es descriptivo correlacional.

### **3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN.**

La institución educativa san pio de Pietrecina se encuentra ubicado en la segunda zona del asentamiento humano de Chacrasana. Cuenta con 40 niños en el jardín aproximadamente su único turno es en la mañana de 8 a 12:30 pm.

### **3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA**

#### **3.3.1. Población.**

Alumnos de la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana- Chosica.

### **3.3.2. Muestra.**

40 niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana- Chosica.

### **3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO**

El instrumento que es la encuesta y las sesiones educativas a las madres sobre el Conocimiento de la pediculosis que será validado por un juicio de los expertos

En cuanto al instrumento el tratamiento de la pediculosis ya ha sido determinado por la OMS.

### **3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS**

Mediante la visita a la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de chacrasana se realizaron las sesiones educativas y la aplicación de las encuestas sobre la pediculosis y su tratamiento.



## CAPITULO IV: RESULTADOS

TABLA 1

### LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA EN EL AÑO 2015.

Tratamiento de pediculosis	ANTES		DESPUES	
	N°	%	N°	%
BUENO	6	14%	26	65%
MEDIO	9	22%	8	20%
BAJO	25	64%	6	15%
TOTAL	40	100%	40	100%
Promedio	11,3		16,6	
Diferencia		(-5,3)		

FUENTE: *Elaboración propia*

#### INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 1:

Antes de la aplicación de La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, es Bajo en un 64%(25), Medio en un 22%(9) y Bueno en un 14%(6), con un promedio de 11,3. Después de la aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento de pediculosis fue Bueno en un 65%(26), Medio en un 20%(8) y Bajo en un 15%(6), con un promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo una diferencia significativa por la aplicación de la labor educativa.

**TABLA 2**  
**TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS ANTES DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA EN EL AÑO 2015.**

<b>Tratamiento de pediculosis</b>	<b>N°</b>	<b>Porcentaje</b>
BUENO	6	14%
MEDIO	9	22%
BAJO	25	64%
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

FUENTE: *Elaboración propia*

**INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 2:**

Antes de la aplicación de La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, es Bajo en un 64%(25), Medio en un 22%(9) y Bueno en un 14%(6),

**TABLA 3**  
**TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS DESPUES DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA EN EL AÑO 2015.**

<b>Tratamiento de pediculosis</b>	<b>N°</b>	<b>Porcentaje</b>
BUENO	26	65%
MEDIO	8	20%
BAJO	6	15%
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

FUENTE: *Elaboración propia*

**INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 3:**

Después de la aplicación de La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, fue Bueno en un 65%(26), Medio en un 20%(8) y Bajo en un 15%(6),

## PRUEBA DE HIPOTESIS

### Prueba de la Hipótesis General:

Ha: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia es eficaz en el tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución educativa de san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015.

Ho: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia no es eficaz en el tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución educativa de san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015.

Ha ≠ Ho

$\alpha=0,05$  (5%)

**Tabla 4: Prueba de Hipótesis mediante la t-Student**

		Diferencias relacionadas					t	gl	Sig. (bilateral)
		Media	Desviación típ.	Error típ. de la media	95% Intervalo de confianza para la diferencia				
					Inferior	Superior			
Antes – Después	-5,30	4,234	2,050	4,612	9,373	8,771	39	,000	

### INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 4

Aplicando la técnica del software SPSS v.21, se obtuvo el valor de la t-Student Calculada ( $t_c$ ) de 8,771; siendo además el valor de la t-Student de Tabla ( $t_T$ ) de 5,623. Como el valor de la T-Calculada es mayor que la T-de tabla ( $t_T < t_c$ ), entonces se rechaza la Hipótesis Nula ( $H_0$ ) y se acepta la Hipótesis Alternativa ( $H_a$ ), con un nivel de significancia de valor  $p < 0,05$ .

Siendo cierto: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia es eficaz en el tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución educativa de san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015.

## **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

En relación al Objetivo General, se buscó determinar La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, encontrando que Antes de la aplicación es Bajo en un 64%(25), Medio en un 22%(9) y Bueno en un 14%(6), con un promedio de 11,3. Después de la aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento de pediculosis fue Bueno en un 65%(26), Medio en un 20%(8) y Bajo en un 15%(6), con un promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo una diferencia significativa por la aplicación de la labor educativa. Coincidiendo con Ontón Jorge Jefferson Melquiades (2009) Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de ectoparásitos (40,3%) en la comunidad indígena Chaparralito de Bongo, sin predilección por el sexo o la edad, constituyendo un problema importante de salud pública. La prevalencia de Pediculosis fue de (75,9%) y de Tungiosis (24,1%). La elevada frecuencia de ectoparásitos (P. humanus y T. penetrans) demostrado en este estudio está relacionado con la falta de educación, la falta de aseo personal, ausencia de servicios públicos, ausencia de calzado, el bajo ingreso familiar y las deficientes condiciones socio-sanitarias en que vive la comunidad Chaparralito de Bongo.

### **OBJETIVO ESPECIFICO 1**

En relación al Objetivo específico uno, se buscó determinar La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, Antes de la aplicación en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, es Bajo en un 64%(25), Medio en un 22%(9) y Bueno en un 14%(6). Coincidiendo con Gineth Adriana González Hernández.2010 Conclusiones: La pediculosis afecta al 42% de los escolares de la Unidad Educativa "Lucila Palacios". La pediculosis capitis, está presente en los escolares de todas las edades, pero con más frecuencia en los grupos de 6 a 8 años, que mayormente corresponde el tercer grado de la etapa escolar, siendo al sexo femenino el más comprometido, sin embargo se puede presentar en ambos sexos en la misma proporción. Los escolares que

presentan el cabello largo, fueron los más afectados por la pediculosis, así como también aquellos con deficiente higiene del cabello. La pediculosis fue más frecuente en los escolares de cabello liso, pero se puede presentar en cualquier tipo de cabello.

## **OBJETIVO ESPECIFICO 2**

En relación al Objetivo específico dos, se buscó determinar La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, Después de la aplicación en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, fue Bueno en un 65%(26), Medio en un 20%(8) y Bajo en un 15%(6),

## **CONCLUSIONES**

### **PRIMERO**

La presente investigación tiene como título: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, encontrando que Antes de la aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento es Bajo, con un promedio de 11,3. Después de la aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento de pediculosis fue de nivel Bueno, con un promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo una diferencia significativa por la aplicación de la labor educativa, considerándola como eficaz. Comprobado estadísticamente mediante la t-student con un valor de 8,771, con 39 grados de libertad y con un nivel de significancia de valor  $p < 0,05$ .

### **SEGUNDO**

Con respecto a la dimensión Antes de la aplicación en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, el nivel de tratamiento de la pediculosis es de nivel Bajo

### **TERCERO**

Con respecto a la dimensión Después de la aplicación en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, el nivel de tratamiento de la pediculosis es de nivel es Bueno.

## **RECOMENDACIONES**

### **PRIMERO**

utilizar el diálogo con el conocimiento de otros profesionales en la labor educativa (psicólogos, docentes), ejerciendo así una práctica de la acción, utilización de recursos metodológicos y didácticos que hacen hincapié en la reflexión de la realidad, pensamiento divergente en la búsqueda de alternativas de cambio, por parte de los profesionales de salud, docentes y padres de familia, para disminuir las enfermedades infectocontagiosas como es la pediculosis.

### **SEGUNDO**

Comprometer al profesional de enfermería con la atención primaria a la población, mediante programas educativos que ayuden a mejorar la salud del grupo más vulnerable como son los escolares que comprenden las edades de 3 a 5 años; además se recomienda campañas frecuentes en pro del tratamiento de la pediculosis, que es muy común en las escuelas, y así poder controlar la infestación y sus consecuencias en la población infantil.

### **TERCERO**

Promover los programas de educación para la salud que deben involucrar tanto a la escuela como a la comunidad, especialmente a las madres de familia, trabajar en colaboración, llegando a los hogares de los niños, con el fin de ampliar conocimientos y mejorar el control y tratamiento de la pediculosis y con ello sus estilos de vida.



## REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Revista argentina de dermatología Aspectos clínico-epidemiológicos sobre pediculosis capitis en arenales, Estado Falcón, Venezuela.
2. ELI MARTINEZ, MARCO DELGADO Y MANUAEL LIU facultad de medicina. “la pediculosis humana por pedículos humanos var” Universidad nacional de san Agustín de Arequipa.2009
3. Esperanza muños torres, facultad de medicina “representaciones sociales sobre la pediculosis en las profesoras, señoras de servicio generales, padres de familia y niños de jardín infantil de la universidad nacional de Colombia. Sede Bogotá”
4. Rocío Quispe Sánchez, tesis de enfermería “Función educativa de la enfermera en la promoción de la salud. Microred Chancas de Andahuaylas DISA IV” UNMAM 2007
5. Gayos p. Carlos a. Nociones epidemiológicas. Edición. 2010
6. T. Wong Oscar. Temas de enfermedades transmisibles sexuales
7. Ignacio Rodrigo. Hombres contra microbios. Edición labor .S.A

### Internet

1. <http://www.bdigital.unal.edu.co/667/1/596892.2007.pdf>
2. <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6375/1/Quezada%20Pati%20C3%B1o%20Mayra%20Alexandra%20.pdf>
3. <http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2191/1/08%20Tesis.WR9%20J45.pdf>
4. <http://www.bdigital.unal.edu.co/667/1/596892.2007.pdf>
5. [http://54.165.197.99/jspui/bitstream/123456789/294/3/TL\\_CabrejoHorna\\_Ana\\_VillenaCarhuallanquiPatricia.pdf](http://54.165.197.99/jspui/bitstream/123456789/294/3/TL_CabrejoHorna_Ana_VillenaCarhuallanquiPatricia.pdf)
6. [http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1298/1/Quispe\\_sr.pdf](http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1298/1/Quispe_sr.pdf)
7. [https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjACahUKEwjNkZn1uvPIAhVGeCYKHRhdCw8&url=http%3A%2F%2Fwww.definicionabc.com%2Fsalud%2Ftratamiento.php&usg=AFQjCNHYbxXQLClk6E40cD7WjnFUIgJubA&sig2=H-CdsspuSo\\_7ixRYSKK32Q](https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjACahUKEwjNkZn1uvPIAhVGeCYKHRhdCw8&url=http%3A%2F%2Fwww.definicionabc.com%2Fsalud%2Ftratamiento.php&usg=AFQjCNHYbxXQLClk6E40cD7WjnFUIgJubA&sig2=H-CdsspuSo_7ixRYSKK32Q)
8. [https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjABahUKEwi-md\\_tvvPIAhUFwiYKHVVPB8g&url=http%3A%2F%2Fwww.desarrolloinfantil.net%2Fsalud-infantil%2Fdesarrollo-del-nino-entre-tres-y-cinco-](https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjABahUKEwi-md_tvvPIAhUFwiYKHVVPB8g&url=http%3A%2F%2Fwww.desarrolloinfantil.net%2Fsalud-infantil%2Fdesarrollo-del-nino-entre-tres-y-cinco-)

anos&usg=AFQjCNHaVijm0e3E\_pX2RLfcVlkSpsTxQ&sig2=bNRRBy7I3zH4wOEi  
YApNYA

9. <http://ri.bib.uod.edu.ve/bitstream/123456789/2191/1/08%20Tesis.WR9%20J45.pdf>

## ANEXO1

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

**TITULO: “INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA-2015”**

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	OPERACIONALIZACION	
			VARIABLES	INDICAODRES
<p><b>Problema general</b> ¿Cómo influye la labor educativa de la enfermera en los padres de familia en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la institución educativa de San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015?</p> <p><b>Problemas específicos:</b> - Como influye la labor educativa de la enfermera en la detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p>	<p><b>Objetivo General</b> Demostrar cómo influye la labor educativa de la enfermera en los padres de familia en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p> <p><b>Objetivos Específicos</b> - Identificar cómo influye la labor educativa de la enfermera en la detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana</p>	<p><b>Hipótesis general</b> La labor educativa de la enfermera en los padres de familia influye significativamente en el tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución educativa de san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015.</p> <p><b>Hipótesis especifica</b> - La labor educativa de la enfermera influye en la detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana</p>	<p><b>Variable independiente:</b> Labor educativa de la enfermera.</p> <p><b>Variable dependiente:</b> Tratamiento de pediculosis</p> <p><b>Variable interviniente:</b> Edades de 3 a 5 años.</p>	<p><b>Variable independiente:</b> - Identificación del problema. -determinar el juicio clínico -Coordinación con los profesores para realizar las sesiones educativas. -Identificación de las necesidades de los alumnos. -Elaboración de cronograma de las actividades educativas. -Actividades educativas en los diferentes escenarios. -Desarrollo del tema educativo referente a la salud del niño. -Técnicas de enseñanza que se</p>

<p>-Cómo influye la labor educativa de la enfermera en la información a los padres las familias de la higiene personal en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p> <p>-Cómo influye la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres de familia en la información del tratamiento de la pediculosis en niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p> <p>-Cómo influye la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres de familia sobre las consecuencias de la pediculosis en los niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana</p>	<p>Chosica en el año 2015.</p> <p>-Explicar cómo influye la labor educativa de la enfermera en la información a los padres de familias de la higiene personal en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p> <p>-Evaluar cómo influye la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres de familia en la información del tratamiento de la pediculosis en niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p> <p>-Evaluar cómo influye la labor educativa de la enfermera en la falta de conocimiento de los padres</p>	<p>Chosica en el año 2015.</p> <p>-La labor educativa de la enfermera influye en la información a los padres las familias de la higiene personal en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p> <p>-La labor educativa de la enfermera influye en la falta de conocimiento de los padres de familia en la información del tratamiento de la pediculosis en niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p> <p>-La labor educativa de la enfermera influye en la falta de conocimiento de los padres de familia sobre las consecuencias de la pediculosis en los niños de 3 a 5 años en la Institución</p>		<p>aplica</p> <p>-Materiales educativos que se usa</p> <p>-Tiempo o duración de las actividades educativas.</p> <p>-Personas responsables a la ejecución de las actividades</p> <p>-Realizar preguntas del tema “pediculosis” que permitan evaluar el tema desarrollado.</p> <p>-refuerzo de las preguntas inadecuadas.</p> <p>-Análisis constructivo de las sesiones educativas.</p> <p><b>Variable dependiente:</b></p> <p>-Revisas el avance del mejoramiento de hacinamiento del hogar</p> <p>-Realiza seguimiento a los cuidados de higiene.</p> <p>-verificar que las etapas del lavado sean correctas.</p>
---	--	---	--	---

<p>Chosica en el año 2015.</p>	<p>de familia sobre las consecuencias de la pediculosis en los niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p>	<p>Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015.</p>		<p>-Evaluar lo aprendido del tema. -verificar que las consecuencias hayan disminuido.</p>
--------------------------------	--	--	--	---

## ANEXO 2

### OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

**TITULO: “INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA-2015”**

<b>VARIABLE</b>	<b>Definición de la variable</b>	<b>DIMENSIONES</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>ESCALA - TIPO</b>
<b>Variable independiente</b>				
Labor educativa de la enfermera.	Son actividades basadas en la educación para la salud que realiza la enfermera en el primer nivel de atención. Esta actividad está orientada a promover cambios de comportamiento y actitudes a favor de la salud de la población, aplicando el proceso de enseñanza – aprendizaje y técnicas de comunicación, Está dirigida al individuo y grupos de personas en diferentes etapas de vida.	<p><b>Diagnostico</b></p> <p><b>Planificación</b></p> <p><b>Ejecución</b></p>	<p>-Identificación del problema.</p> <p>-determinar el juicio clínico</p> <p>-Coordinación con los profesores para realizar las sesiones educativas.</p> <p>-Identificación de las necesidades de los alumnos.</p> <p>-Elaboración de cronograma de las actividades educativas.</p> <p>-Actividades educativas en los diferentes escenarios.</p> <p>-Desarrollo del tema educativo referente a la salud del niño.</p> <p>-Técnicas de</p>	<p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p>

		<b>evaluación</b>	<p>enseñanza que se aplica</p> <p>-Materiales educativos que se usa</p> <p>-Tiempo o duración de las actividades educativas.</p> <p>-Personas responsables a la ejecución de las actividades</p> <p>-Realizar preguntas del tema “pediculosis” que permitan evaluar el tema desarrollado.</p> <p>-Refuerzo de las preguntas inadecuadas.</p> <p>-Análisis constructivo de las sesiones educativas.</p>	<p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p>
<b>Variable dependiente</b>				
Tratamiento de Pediculosis	Lo ideal es la consulta con el pediatra o dermatólogo para que sea él quien indique el tratamiento más adecuado para eliminar tanto a la población adulta de piojos como a su cría (huevos y	<p>Hacinamiento</p> <p>Falta de higiene</p>	<p>-Revisas el avance del mejoramiento de hacinamiento del hogar</p> <p>-Realiza seguimiento a los cuidados de higiene.</p> <p>-Verificar que las</p>	<p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p>

	<p>larvas).</p> <p>Lavar la ropa usada con agua caliente; Pasar aspiradora en sillones, asientos, etc; Cambiar la ropa de cama y lavarla con agua caliente; Lavar los juguetes de uso diario; Lavar con agua caliente los peines y cepillo de uso diario y es muy importante no utilizar sustancias peligrosas (kerosén, insecticidas, etc.)</p>	<p>Falta de conocimiento Y Consecuencias de la pediculosis.</p>	<p>etapas del lavado sean correctas.</p> <p>-Evaluar lo aprendido del tema.</p> <p>-Verificar que las consecuencias hayan disminuido</p>	<p>Cualitativa</p> <p>Cualitativa</p>
--	--	---	--	---------------------------------------



### ANEXO 3

#### ENCUESTA –CUESTIONARIO-ENTREVISTA

#### ENCUESTA

Sr(a) se presenta la encuesta para que sea respondida con mayor veracidad, para realizar una investigación sobre la pediculosis lo cual ayudara en la prevención y tratamiento de dicha enfermedad. Se le agradece su colaboración, la cual es anónima.

Marca con un aspa (x) la respuesta que Uds. Crea conveniente, gracias

PREGUNTAS		
1. ¿Sabe que significa pediculosis?	SI	NO
2. ¿De niño tuvo piojo?		
3. ¿Solo los niños o las niñas tienen piojo?		
4. ¿Tener piojo es un problema común?		
5. ¿Los piojos saltan de persona a persona?		
6. ¿La falta de higiene en los niños(as) atraen a los piojos?		
7. ¿La falta de higiene del cabello en los niños(as) es el causante para el aumento del piojo?		
8. ¿Los piojos pueden llegar a matar a los(as) niños(as)?		
9. ¿Los niños(as) de bajos recursos económicos son los únicos que tienen piojos?		
10. ¿Los piojos comúnmente aparecen al inicio del año escolar?		
11. ¿Los niños se contagian con piojo en la escuela?		
12. ¿A la semana del contagio, los padres se dan cuenta de la		

presencia del piojo?		
<b>13.</b> ¿Los piojos se alimentan de la sangre?		
<b>14.</b> ¿Los niños(as) que tienen piojo deben asistir al colegio?		
<b>15.</b> ¿Los piojos pueden vivir en la ropa o en la cama de los niños(as)?		
<b>16.</b> ¿En alguna oportunidad la enfermera le brindo información sobre la pediculosis?		
<b>17.</b> ¿Son importante las sesiones educativas que brindan las enfermeras, para prevenir la pediculosis?		
<b>18.</b> ¿Es posible que corte de cabello soluciona el problema de piojos?		
<b>19.</b> ¿Los piojos se pueden eliminar con champú (nopusid) o parafinas?		
<b>20.</b> ¿Conoce algún método efectivo para eliminar los piojos?		



LIC.....

**Presente:**

Por la presente, reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre de la Escuela Académico Profesional de enfermería de la Universidad Alas Peruanas sede Chosica y mi persona; luego para manifestarle, que estoy desarrollando la tesis titulada: “INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA 2015”; por lo que conocedores de su trayectoria profesional y estrecha vinculación en el campo de la investigación, le solicito su colaboración en emitir su JUICIO DE EXPERTO, para la validación del instrumento **“encuesta sobre la labor de la enfermera y tratamiento de la pediculosis en los niños de 3 a 5 años”**; de la presente investigación.

Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración como experto, me suscribo de usted.

ATENTAMENTE

De investigadora: GUTIERREZ RODRIGUEZ SINRRY A.

**FORMATO PARA JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN**
**I. DATOS GENERALES**

1.1. Apellidos y nombre(s) del informante:  
.....

1.2. Cargo e institución donde labora: **Estudiante de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas.**

1.3. Nombre del instrumento: **PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

1.4. Título de la Tesis: **INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA2015.**

1.5. Autor de la Tesis: **GUTIEREZ RODRIGUEZ SINRRY ALICIA**

1.6. Sección: **VII ciclo de Enfermería**

**II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:**

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 1-20	Regular 21-40	Buena 41-60	Muy Buena 61-80	Excelente 81-100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					
3. ACTUALIDAD	Está adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.					
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica entre variables e indicadores.					
5. SUFICIENCIA	Comprende aspectos cuantitativos y cualitativos.					
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar aspectos referidos a la Mención, en relación con el logro de la calidad académica.					
7. CONSISTENCIA	Establece una relación pertinente entre la formulación del problema,					

	los objetivos y la hipótesis.					
8. COHERENCIA	Existe relación entre los indicadores y las dimensiones.					
9. METODOLOGÍA	Responde al propósito de la investigación.					
10. PERTINENCIA	El instrumento es aplicable					

**III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD:**.....

**IV.PROMEDIO DE VALORACIÓN:**

**OPINIÓN DE APLICABILIDAD:** a) Deficiente b) regular c) Buena d) Muy buena e) Excelente

<b>Nombres y Apellidos:</b>		<b>DNI N°</b>	
<b>Dirección domiciliaria:</b>		<b>Teléfono/Celular:</b>	
<b>Título profesional / Especialidad</b>			
<b>Grado Académico:</b>			
<b>Mención:</b>			
<b>N° de Colegiatura</b>			

**LUGAR Y**

**FECHA:**.....

\_\_\_\_\_  
Firma del Experto Informante