

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

TESIS

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE CARIES SEGÚN EL ÍNDICE CPOD EN PACIENTES ADULTOS CHACCHADORES DE HOJA DE COCA DEL DISTRITO DE JOSÉ MANUEL QUIROZ-SAN MARCOS-CAJAMARCA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA

PRESENTADO POR EL BACHILLER

TORRES PORTUGUEZ, CINTHYA GISSELLA

ASESOR

CISNEROS DEL ÁGUILA, MELVIN

LIMA - PERÚ

2013

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia de caries dental, actitudes en el hábito del chacchado y el índice CPOD en una población de adultos de 20 a 60 años chacchadores de hoja de coca. La muestra correspondió a 365 chacchadores de hojas de coca; se utilizó instrumental y material de uso cotidiano para el examen clínico. El primer momento correspondió a una preselección de la población aplicando los criterios de inclusión y exclusión; en segunda instancia se procedió al examen clínico y anamnesis respectivos, dichos datos fueron consignados en la historia clínica y el cuestionario preparados especialmente para este estudio. Los resultados indican que la mayor frecuencia de chacchado fue de una vez al día (34 %). El complemento más utilizado del chacchado fue la cal (60 %). El grupo etario que más piezas cariadas presentó fue el de 30-39 (34,5 %); más piezas perdidas el de 50-60 (55,2 %), más piezas obturadas el de 30-39 (39,4 %), más piezas cariadas con indicación de exodoncia el de 50-60 años (51,8 %). La prevalencia de caries correspondió a (98 %). El grupo etario con más alto índice CPOD fue el de 50-60 años 10,22 %. El índice CPOD del total de la muestra correspondió a 7,56 %. Se concluye que la cal y mishquina son complementos preferidos por el chachador; a mayor edad, mayor cantidad de piezas perdidas y con indicación de exodoncia. La prevalencia de caries es bastante elevada y el índice CPOD corresponde a un nivel de severidad muy alto.

PALABRAS CLAVES: Pruebas de Actividad de Caries Dental, Coca, Cirugía Bucal.